

Bleiben Sie geschützt!

Für einen langfristigen Schutz braucht es mehr als eine Impfung. Folgen Sie den aktuellen Impfpfehlungen und schützen Sie damit sich selbst und alle, die besonders gefährdet sind.

- Der **Impfschutz nimmt mit der Zeit ab**. Allen Geimpften wird eine weitere **Impfung** mit einem **mRNA-Impfstoff** empfohlen.
- Durch die Omikron-Variante steigt das **Ansteckungsrisiko**. Das Risiko von Impfnebenwirkungen ist **deutlich geringer** als das Risiko einer schweren Erkrankung.
- **Die Impfung wirkt**. Sprechen Sie mit anderen über **Ihre Erfahrungen** und entkräften Sie falsche Behauptungen.

Wichtig zu wissen

Daten zeigen: Die 3. Impfung schützt auch gegen Omikron. Nach der Impfung soll man sich 3 Tage schonen und eine Woche auf Sport verzichten.

Jetzt impfen!

Informieren Sie sich ausführlich über die Impfung bei Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Anmeldung unter: impfen.gv.at



Weitere Informationen

(auch mehrsprachig) finden Sie auf unserer Webseite:

sozialministerium.at/corona-schutzimpfung



Impressum

Medieninhaber:in und Herausgeber:in:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)
Stubenring 1, 1010 Wien
+43 1 711 00-0

Verlags- und Herstellungsort: Wien
Titelbild: © istockphoto.com/piola666
Layout & Druck: BMSGPK
März 2022

Vorbehaltlich allfälliger Irrtümer, Druck- und Satzfehler.
Alle Rechte vorbehalten.

Sozialministerium

≡ Bundesministerium
Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz

Corona-Schutzimpfung Wissenswertes zur dritten Impfung

Die Impfung wirkt!



Lassen Sie sich wieder impfen!

Für einen längerfristigen Schutz ist eine 3. Impfung ab 12 Jahren allgemein empfohlen. Das Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf bleibt für Geimpfte auch bei einer Ansteckung mit Omikron gering.

- Die 3. Impfung ist für 12- bis 17-Jährige ab 6 Monaten nach der zweiten Impfung empfohlen, für **Personen ab 18 Jahren schon ab 4 Monaten**.
- Die 3. Impfung ist auch für 2 Mal mit **COVID-19 Vaccine Janssen** („Johnson&Johnson“) geimpfte Personen empfohlen (ab 4 Monaten nach der 2. Impfung).
- Auch **genesene Personen** sollen sich impfen lassen. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt!

Wichtig zu wissen

Impfempfehlungen können sich ändern. Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über Ihren Impfstatus!

Halten Sie den Impfschutz aufrecht!

Die Omikron-Variante ist wesentlich ansteckender als alle bisherigen Varianten. Nach der 3. Impfung mit einem mRNA-Impfstoff wurde auch bei Omikron eine gute Schutzwirkung festgestellt.

- Für die 3. Impfung sind bevorzugt mRNA-Impfstoffe empfohlen: **Comirnaty von BioNTech/Pfizer** oder **Spikevax von Moderna** (Moderna erst ab 30 Jahren).
- Für Personen, die **geimpft und genesen** sind, gelten unterschiedliche Empfehlungen. Sprechen Sie bitte mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt!
- Die 3. Impfung gibt es schnell und unkompliziert an vielen Stellen in Ihrer Nähe. Alle Infos unter [impfen.gv.at](https://www.impfen.gv.at)

Wichtig zu wissen

Daten zeigen, dass geimpfte Personen eine geringere Viruslast haben und somit weniger ansteckend sind als ungeimpfte Personen.

Reden wir darüber!

Wie kann man zögerlichen, verunsicherten und ängstlichen Menschen am besten begegnen? Hier finden Sie gute Argumente für die Corona-Schutzimpfung:

- **Die Impfung wirkt.** Auch die Corona-Schutzimpfung kann nicht immer eine Infektion und Erkrankung verhindern. Infiziert man sich trotz Impfung mit dem Coronavirus, so erkrankt man aber in der Regel **wesentlich milder**.
- **COVID-19 ist gefährlich, die Impfung schützt.** Es müssen nachweislich mehr ungeimpfte Menschen im Krankenhaus gegen COVID-19 behandelt werden als aufgrund von Impfkomplicationen.
- **Die Impfung schützt auch vor möglichen Langzeitfolgen der Erkrankung COVID-19.**

Wichtig zu wissen

Bis ausreichend viele Menschen geimpft sind, müssen Schutzmaßnahmen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.